

Africký mor prasat a možnosti předcházení této nákazy


(Informace Státní veterinární správy, Slezská 7/100, Praha 2, 120 56)



Africký mor prasat (AMP)

- je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat
- je charakteristický vysokou, téměř 100 % letalitou
- je přenosný přímým kontaktem, exkrementy a sekrety nakaženého zvířete nebo prostřednictvím klíšťat na prase domácí i divoké
- se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů a krváceninami v podkoží
- se dále projevuje u prasnic zmetáním
- charakterizuje výrazné zvětšení sleziny na rozdíl od KMP, krváceniny v mízních uzlinách, ledvinách a dalších vnitřních orgánech

Možnosti předcházení této nákazy



Chovatelé hospodářských zvířat

- dodržovat ve svých chovech zásady biologické bezpečnosti
- zamezit vniknutí divokých prasat do areálu hospodářství, případně jejich kontaktu s krmivem a stelivem
- respektovat zákaz používání kuchyňských odpadů ke krmení zvířat

Myslivci

- věnovat zvýšenou pozornost uloveným divokým prasatům, zda se u nich neprojeví některé výše popsané příznaky
- nález většího množství uhynulých divokých prasat okamžitě hlase na místně příslušnou Krajskou veterinární správu, která zajistí odběr vzorků a jejich transport do laboratoře

V České republice se africký mor prasat nikdy nevyskytoval. Vakcinace prasat proti této nákaze je jednak zakázána legislativou a vakcína neexistuje. V Evropě se dlouhodobě africký mor vyskytuje na Sardinii. Jedná se však o izolovanou lokalitu, odkud se nákaza dále nešíří. V roce 2008 byl africký mor prasat potvrzen v Azerbajdžánu. Odtud se nákaza postupně šíří přes Rusko, až v letošním roce byla potvrzena v Litvě, z čehož vyplývá reálné nebezpečí i pro Českou republiku.

Další informace o africkém moru prasat včetně kontaktů na jednotlivá regionální pracoviště, naleznete na webu Státní veterinární správy ČR <http://www.svscr.cz>.